## UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



## "GESTACION POSTERMINO COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO A APGAR BAJO AL NACER EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO"

# TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE: MEDICO CIRUJANO

AUTOR: VICTOR HUGO YUPANQUI DE LA CRUZ

ASESOR:
DR. ORLANDO SALAZAR CRUZADO

TRUJILLO – PERÚ 2015

## **MIEMBROS DEL JURADO:**

PRESIDENTE
Dr. CESAR HERRERA GUTIERREZ
SECRETARIO
Dr. YUL BRAVO BURGOS
•••••
VOCAL
Dr. JOSE CHAMAN CASTILLO

### **DEDICATORIA**

Quiero dedicar este trabajo a mis Padres por ser mi apoyo constante e incondicional en mi carrera profesional, en especial a mi madre por ser mi fuente de inspiración y ejemplo para salir siempre adelante ante cualquier adversidad de la vida, y por ser claro ejemplo de lucha constante, fuerza, coraje y superación. Con su demostración de Padres ejemplares me han enseñado a no desvanecer ni rendirme ante nada y siempre luchar y conseguir los éxitos a través de sus sabios consejos.

Todo lo que soy, lo soy gracias a ustedes, los amo, admiro y respeto, son mi ejemplo en lo personal y profesional.

#### **AGRADECIMIENTOS**

A Dios por sus muchas bendiciones y la vida.

A mis Padres por ser fuente de apoyo constante e incondicional y más aún en mis años de carrera profesional, gracias por todo su apoyo incondicional, su respeto y cariño.

A mi compañera Patricia y a mis hijos que son mi inspiración para seguir adelante, a mi compañera Patricia por ser mi apoyo incondicional y por su amor, y a mis hijos Grecia y Víctor por ser lo más hermoso que tengo en la vida, mis más grandes orgullos.

A la Prestigiosa Universidad Privada Antenor Orrego, alma máter, por darme la oportunidad de estudiar mi segunda carrera (Medicina Humana), y a la Escuela Profesional de Medicina Humana por albergarme en sus aulas y brindarme la mejor plana docente de nuestro país, contribuyendo de gran manera a mi formación académica y profesional.

A mis docentes por brindarme sus experiencias y enseñanzas y ser mi guía en este largo camino universitario.

A mi asesor por su labor y compartir sus conocimientos.

### **INDICE**

Página	ı
RESUMEN	
ABSTRACT	
I INTRODUCCION01	
1.1. Marco Teórico	
1.2. Antecedentes	
1.3. Justificación	
1.4. Formulación del Problema Científico	
1.5. Objetivos	
1.6. Hipótesis07	
IIMATERIAL Y METODOS	
2.1. Población Diana o Universo	
2.2. Población de estudio	
2.3. Muestra	
2.3.1. Unidad de ánalisis	
2.3.2. Unidad de muestreo	
2.3.3 Tamaño muestral	
2.4. Diseño de estudio	
2.5. Variables y escalas de medición12	
2.6. Definiciones operacionales	
2.7. Procedimientos	
2.8. Procesamiento y análisis de la información14	

2.9. Aspectos Éticos	
III RESULTADOS16	
IV DISCUSION	
V CONCLUSIONES25	
VI SUGERENCIAS25	
VII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS26	
ANEXOS	
<u>ÍNDICE DE TABLAS</u>	
Página	
TABLA N° 0116	
TABLA N° 02	
TABLA N° 03	
TABLA N° 04	
TABLA N° 0521	
<u>ÍNDICE DE CUADROS</u>	
Página	
GRÁFICO N° 01	
GRÁFICO N° 02	
GRÁFICO N° 03	

**RESUMEN** 

Objetivo: Determinar si la gestación postérmino es factor de riesgo asociado a

Apgar bajo al nacer en el Hospital Belén de Trujillo.

Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo, analítico, observacional,

retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por

130 neonatos según criterios de inclusión y exclusión establecidos distribuidos en dos

grupos: con y sin Apgar bajo al nacer.

Resultados: La frecuencia de gestación postermino en los pacientes con y sin Apgar

bajo al nacer fue de 22% y 9% respectivamente. El odss ratio de gestación

postermino en relación a Apgar bajo al nacer es de 2.69 (p<0.05). Los promedios

de Apgar al nacer en el grupo con gestación postermino y a término fueron de 6.2 y

8.3 respectivamente (p<0.05).

Conclusiones: La gestación postermino es factor de riesgo asociado a Apgar bajo al

nacer. El promedio de puntaje Apgar de los neonatos de gestaciones postermino es

signicativamente menor que el de los neonatos de gestaciones a termino.

Palabras Clave: Factor de riesgo, gestacion postermino, Apgar bajo al nacer.

**ABSTRACT** 

**Objetive:** To determine whether post-term pregnancy is a risk factor associated with

low Apgar score at birth in Bethel Trujillo Hospital.

**Methods:** Study type, observational, retrospective, case-control was performed. The

study population consisted of 130 infants according to inclusion and exclusion

criteria established divided into two groups: with and without low birth Apgar.

Results: The frequency of post-term pregnancy in patients with and without low

Apgar score at birth was 22 % and 9% respectively. The odds ratio of post-term

pregnancy in relation to low Apgar score at birth is 2.69 (p < 0.05). The average

Appar at birth in the group with post-term gestation and term were 6.2 and 8.3

respectively (p < 0.05).

Conclusions: The post-term pregnancy is a risk factor associated with low Apgar

score at birth. The average neonatal Apgar score of post-term pregnancies is

signicantly lower than infants of pregnancies to term.

**Kewwords:** Risk factor, posterm pregnancy, low Apgar score at birth.